

DRÓB

Brojler _ Okresy odchowu

Prestarter 1-10 dni
Starter 11-24 dni
Grower 25-35 dni
Finisher-1 36-42 dni
Finisher -2 powyżej 42 dni (brojler ciężki)

Nioski reprodukcyjne (jaja konsumpcyjne) _ Okresy odchowu

Starter 1-4 tygodnie
Grower-1 5-8 tygodni
Grower -2 9-16 tygodni
Przednieśna od 17 tygodni do 5 % nieśności

Nioski towarowe _ (jaja konsumpcyjne) Okresy odchowu

FAZA_1 od 5% nieśności w stadzie do 45tygodnia życia
poziom nieśności powyżej 90%
FAZA_2 od 46 do 60 tygodnia życia
poziom nieśności 85-90%
FAZA_3 od 61 tygodnia życia
poziom nieśności poniżej 85%

Indyki reprodukcyjne

Prestarter 0-3 tygodnia
Starter 4-6 tygodnia
Grower_ 1 7-10 tygodnia
Grower_ 2 11-14 tygodnia indyczka
11-16 tygodnia indor
Grower_ 3 14-29 tygodni indyczka
Grower_ 3 od 17 tygodnia Indor
Nioska reprodukcyjna indyczka od 29 tygodnia

Indyki rzeźne

Prestarter 0-3 tygodni
Starter 4-6 tygodni
Grower_ 1 7-9 tygodni

Grower_ 3 13-15 tygodni
Finisher -1 16-18 tygodni (indor)
od 16 tygodni życia do uboju (indyczka)
Finisher -2 od 19 tygodni życia do uboju (indor)

Gęsi mięsne (rzeźne)

Prestarter 0-3 tygodni

Starter 4-8 tygodni

Grower 9-11 tygodni

Finisher 12 tygodni do uboju

Kaczki mięsne (rzeźne)

Starter 0-3 tygodni

Grower 4-6 tygodni

Finisher 7 tygodni do uboju

Bażanty mięsne (rzeźne) odchów intensywny

Starter 0-4 tygodni

Grower 5-8 tygodni

Finisher 9-17 tygodni do uboju

Kuropatwy

Starter 0-2 tygodni

Grower -1 3-4 tygodni

Grower-2 5-12 (lub do uboju)

FAZA SPOPCZYNKU (wrzesień -marzec)

FAZA REPRODUKЦИИ (marzec kwiecień)

FAZA NIEŚNOŚCI (maj- czerwiec)

TRZODA CHLEWNA

Loszki i lochy

LOSZKI okresy odchowu

FAZA-1 30-60kg

FAZA-2 60-90 kg

FAZA-3 od 90 kg do pokrycia

LOCHY fazy żywienia

FLUSHING (od odsadzenia prosiąt do wystąpienia rui)

NISKA CIĄŻA do 12 tygodnia ciąży

WYSOKA CIĄŻA od 12 tygodnia ciąży do porodu

LAKTACJA (od porodu do odsadzenia prosiąt)

TUCZ INTENSYWNY

Prestarter do 3 tygodnia życia

Odsadzeniowa 4-6 tygodnia życia

Starter do 30kg

FAZA-1 Tucz 30-60 kg

FAZA- Tucz 60-90 kg

FAZA-13 Tucz od 90kg do uboju

Knury reprodukcyjne

Odchów od 30- do 120 kg

Knury rozplodowe

BYDŁO

Cielęta 0-2 miesięcy

Cielęta 2-8 miesięcy

Młodzież od 8 do 16 miesięcy

Pierwiastki (od pokrycia do porodu) 16-25 miesięcy

KROWY

FAZA ZASUSZONENIA (wysoka ciąża)

FAZA LAKTACJI

BUHAJ (reproduktor)

BYDŁO OPASOWE(mięsne) tucz intensywny

INNE PRZEŻUWACZE

KOZY (rosnące i tucz mięsny jagniąt)

OWCE (rosnące i tucz mięsny jagniąt)

KONIE

Trening rekreacyjny

Trening sportowy lekki

Trening sportowy średni

Trening sportowy intensywny (wyczynowy)

RYBY

Ryby słodkowodne zimnolubne

Ryby słodkowodne ciepłolubne

Zwierzęta Futerkowe

NORKI

LISY